

INFORMACION AGROECONOMICA

1

Tipo de pastura por Región	Prod. Anual Kg MS/ha/año	Verano (*) promedio Kg MS/ha	Verano (*) 2002 kg MS/ha	Variación 2002/prom
BASALTO				
CN promedio	4,230	1,494	1,557	4,2 +
CNM (TB+L) prom.	7,000	2,140	2,900	35 +
CRISTALINO				
CNM c/Rincón promedio	7,705	2,300	3,398	44 +
CNM (TB+L) prom.	8,100	2,569	3,314	29 +
LOMADAS del ESTE				

Fuente: Rizzo, D. y col. (com. pers.)

1 La producción de pasto estival fue superior a lo normal para la mayoría de los tipos de suelos observados. Esta oferta ha contribuido probablemente a obtener mejores performances productivas de verano. Pero este excedente estacional, requiere de un manejo adecuado para poder mantener la condición de ganados y pasturas, durante el invierno. De la misma forma el excedente de pasto estival, es un factor a tener en cuenta a la hora de implantar y/o mantener los mejoramientos extensivos.

2 En el ejercicio considerado los corderos fueron quienes mantuvieron mas estable su cotización. Los terneros presentaron un comportamiento intermedio, mientras los novillos fueron los que acusaron mas fuertes presiones a la baja. Esta situación se produjo a consecuencia de la pérdida del status sanitario y del inmediato ajuste de valor de las categorías exportables. Se debe tener en cuenta que la aparición de la aftosa no repercutió en mayor medida en el ejercicio anterior, debido a que ya había una gran cantidad de terneros comercializados. Es esperable que el efecto negativo en esta categoría se visualice en la presente zafra.


3 Se observa un stock de vacas de cría y terneros para esta zafra superior a todos los valores de la serie. En función de la condición corporal con la que entrarán al invierno, es esperable un nuevo año de pariciones record. Esta mayor producción de terneros, sumada a las restricciones comerciales que probablemente se mantendrán en el próximo año, genera una incertidumbre respecto a la cotización y destino de los mismos. De la misma forma se deberán extremar los cuidados para lograr que los vientres paridos queden nuevamente preñados.

4 El impacto en las cotizaciones de las categorías comercializadas en feria que provocó la aftosa, tuvo un comportamiento totalmente distinto en lanares y vacunos. Mientras que en los primeros apenas si generó una variación, en los segundos, produjo una caída en el entorno de un 20%.

2



3



4

