


“Espartillo de verano o pasto baqueta”



Nombre común: espartillo de verano o pasto baqueta, ya que su espiga recuerda a la baqueta que se utiliza para limpiar el caño de las armas de fuego.

Nombre científico: *Sporobolus indicus*.

Ciclo: vive más de un año (perenne) y su crecimiento se da fundamentalmente en primavera - verano.

Tipo productivo: no tiene capacidad engordadora ni criadora, es clasificado como pasto ordinario a duro.

Productividad: media.

Mes de semillazón: de enero a mayo.

Algunas características: pasto tipo mata (cespitoso), de hojas angostas, sin pelos, con una nervadura central blanquecina, fácilmente apreciable. Habita lugares variables, abundando en zonas degradadas y raleadas, de los trillos, dormideros, saleros, rodeos y poblaciones.

Es común encontrarlo en suelos planos de basalto (plano-soles). Comido cuando joven, fundamentalmente por vacunos. Pasto resistente al pisoteo. Su espiga queda de coloración negra ya que generalmente está atacada por un hongo (falso carbón del espartillo). Las puntas de sus hojas, en invierno debido a las heladas se secan y enrulan, ofreciendo el aspecto de una cabellera. Su aumento en algunos potreros puede deberse a la recarga prolongada de los mismos.

Material consultado:

Burkart A. *Flora ilustrada de Entre Ríos*.

Landi, M., Galli, I. *Introducción al manejo del campo natural en la provincia de Entre Ríos*.

Fernández, R., Viviani E. *Guía de reconocimiento de especies de campo natural*.

Rosengurt, B. *Tablas de comportamiento de las especies de plantas de campos naturales en el Uruguay*.

Fotografía: Pereira M. Instituto Plan Agropecuario.