

# El extendido período de pariciones

## Predio “La Anacahuita” de Gustavo da Silva y Carolina Paiva

Ing. Agr. Juan Andrés Moreira da Costa  
 Plan Agropecuario

Gustavo da Silva (Dido) y Carolina Paiva son productores que colaboran con el Instituto Plan Agropecuario en el Proyecto de cría del FTTC. Su establecimiento ganadero se ubica, en la zona de Cuaró casi sobre la estación Camaño, en el departamento de Artigas. Hoy trabajan para acortar la parición y lograr terneros parejos con altos pesos al destete sin perder la eficiencia reproductiva del rodeo.

Luego de años trabajando como empleados en diversas actividades, lograron el tan añorado sueño, trabajar para sí mismos en lo que les apasiona, la ganadería vacuna de cría. Los primeros ahorros fueron invertidos comprando novillitos que criaban en campos a pastoreo, posteriormente dieron un paso más comprometido animándose a arrendar, hasta que por fin las circunstancias se fueron dando de tal forma que lograron la tan ansiada tierra propia. Una vez más se confirma la regla, que con esfuerzo trabajo y dedicación, los sueños se hacen realidad. Actualmente muestran con orgullo su establecimiento ganadero, “La Anaca-



Foto: Plan Agropecuario

huita”, en referencia a ese árbol que imponente sobresale frente al casco, centinela de varias décadas vividas.

### El momento de destete y sus consecuencias

Las pasturas naturales del Basalto se caracterizan por presentar una alta variabilidad productiva en primavera y verano. Cuando estas estaciones se presentan lluviosas, como las anteriores, las tasas de crecimiento forrajeros registradas pueden superar hasta en un 50% a las producciones promedio de muchos años. Frente a esta realidad, los productores se ven tentados a realizar cambios de estrategias de manejo basados en el dicho “más vale pájaro en mano que cien volando”. Uno de los cambios que realizan es la modificación del período de amamantamiento de los rodeos, atrasando el momento del destete y con ello “buscan aprovechar la sobreoferta forrajera” para destetar terneras más pesadas. Pero todo esfuerzo tiene un costo energético y por lo tanto una consecuencia, seguramente sumándose a otras causas que provocan el alargamiento del período de parto de algunos rodeos.

Para estos productores, este aspecto productivo es uno de los que más les preocupa, asociado al extenso período de servicios (4-5 meses). Si bien este último factor por sí mismo no implica una mejora en la eficiencia de la tasa reproductiva, siempre y cuando las vacas lleguen individualmente al servicio con un estado corporal adecuado (4 puntos de CC) y una correcta sanidad (desparasitadas y sin enfermedades reproductivas), puede volverse clave cuando el período de partos es extendido (mayor a 4 meses) y el objetivo es mantener la tasa de destete.

Varias fuentes de investigación, indican que una de las razones fundamentales que explica el largo período de parición, está asociado al tiempo que los animales permanecen en anestro (no se alzan) luego del parto, pero también cuando es acompañado por un largo período de servicio (4-5 meses). Esa consecuencia, se observa fundamentalmente en las categorías de primer y segundo parto, o sea al segundo y tercer entore también. Como resultado del largo período de parición (4-5 meses), se destetan terneras de diferente edad y tamaño y

por lo tanto de menor peso promedio al momento del destete.

Una medida de manejo que salvaría esas diferencias, podría ser manejar el destete en tandas, aunque con el consiguiente costo energético sobre la vaca, debido a lactancias tardías en el otoño. Otra medida correctiva podría ser acortar definitivamente el servicio (entore de 60-70 días) en el mismo año, estando dispuestos a que falle parte del ganado, fundamentalmente la cola de parición. La decisión tomada para este rodeo, es el destete en forma escalonada o tandas.

### Las recrias y la primera cría

Según el profesor (CVM, MS. Lawrence E. Rive)\*, afirma que la mayoría de los problemas de los rodeos de cría, se pueden atribuir al manejo de las vaquillonas. Así como la solución al largo período de partos, comienza con el manejo de las recrias. En el tiempo de parición de un rodeo, el segundo parto, es el que realmente marca los futuros patrones de parición. Por este motivo los máximos esfuerzos dedicados al manejo del rodeo en La Anacahuita, vienen siendo realizados en la mejora de las categorías de recria, pero también en forma especial sobre la categoría de primera cría luego del parto.

Luego del destete, durante el primer invierno, las terneras son clasificadas por tamaño. Las de menor tamaño son suplementadas con afrechillo de arroz (1% del peso vivo) y el resto también suplementadas pero con proteína en autoconsumo y regulada con sal, sobre campo natural con alta disponibilidad de forraje. Antes del segundo invierno se hace una venta del excedente de reposición, terneras que fueron clasificadas por tener un tamaño y desarrollo inferior.

Al segundo invierno, durante la etapa como vaquillonas, son manejadas sobre campos con pasturas reservadas y suplementadas también con proteína, con lo cual alcanzan al cumplir los dos años y previo a la inseminación, un peso próximo a 300 kg.

Se sabe que el momento crucial en la vida reproductiva de una vaca ocurre luego del primer parto. Sabiendo lo



Foto: Plan Agropecuario

que significa este esfuerzo para la categoría, es que en este establecimiento son suplementadas con afrechillo de arroz, inmediatamente de paridas y durante el entore con ternero al pie. Esta es una técnica que el INIA ha validado, con resultados positivos.

### Esperando resultados

En ganadería como en otros sistemas, es tan importante producir como conocer las formas. Para ello, la gestión del proceso es la clave, encontrando en el registro de datos desde el campo, un elemento fundamental para la toma de decisiones. En los resultados obtenidos de un programa de cría, hay muchas variables que intervienen y para cada sistema se prioriza en diferentes etapas del proceso.

Particularmente en este sistema, se viene trabajando para acortar el tiempo de periodos de partos sin perder terneros. Es de esperar que luego de 3 o 4 años manejando las recrias de la forma descrita y controlando la reproducción de las categorías de primer parto, el tiempo de parición se vaya acortando. En cría vacuna, cono-

cer la tasa de preñez del rodeo resulta clave para realizar un primer monitoreo del proceso, sabiendo "cuántos terneros están sembrados". Es la forma de proyectar resultados, pero además es la forma de evaluar las medidas de manejo realizadas y las respuestas obtenidas. Pero luego de la preñez, el proceso continúa, pasando por otras etapas sumamente claves durante la gestación, hasta llegar al destete, "la cosecha de terneros." Recién ahí se pasa raya a la ecuación con los kilos de ternero destetados, que en definitiva son los que valen. Por lo que la registración para determinar el patrón de partos del rodeo es una de las claves para orientar un sistema de cría con rumbo a lograr terneras parejas y pesadas al momento del destete, pero a su vez cuidando a la vaca para que no tenga un gasto excesivo de energía antes del próximo servicio.

(\*)- Colegio de Medicina Veterinaria, Universidad del Estado de Oklahoma, Stillwater, Oklahoma-Selección de Temas Agropecuarios, La Revista del Siglo XXI, Ed. Hemisferio Sur- 1993). ■